

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver starkt uppmärksamhet. Om avsättningen kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedlet på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ibuprofen B. Braun innehåller natrium

Detta läkemedlet innehåller 179 mg natrium (huvudingredienster i konsistens/bordssalt) per 50 ml. Detta motsvarar 9 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

3. Hur du får ibuprofen B. Braun

Detta läkemedlet ordineras av en läkare och ges till dig av en läkare eller sjuksköterska i en miljö där lämplig utrustning finns tillgänglig.

Läkaren anpassar dosen individuellt för dig baserat på din kroppsvekt och ditt almtillstånd.

Hos barn och ungdomar baserar sig dosen på kroppsvekt och ålder, 5–10 mg/kg kroppsvekt som en enkeldos upp till en maximal dosyngos om 30 mg/kg kroppsvekt:

Barn som väger 20–29 kg (6–9 år): 200 mg ibuprofen upp till 3 gånger per dygn, överstyrkint ute till 300 mg.

Barn som väger 30–39 kg (10–11 år): 200 mg ibuprofen upp till 4 gånger per dygn, överstyrkint ute till den maximala dosyngos om 800 mg.

Ungdomar som väger mindre än 40 kg (12–17 år): 200–400 mg ibuprofen upp till 3 gånger per dygn, överstyrkint ute till den maximala dosyngos om 1200 mg.

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn som väger mindre än 20 kg eller som är yngre än 6 år.

Vid bestämning av doseringssintervallet bör hänsyn tas till patientens symtom och maximal dosyngos. Doseringssintervallet ska vara minst 6 timmar. Rekommenderad maximal dosyngos ska inte överskridas.

Den lägsta effektiva dosen ska användas under kortast möjliga tid för att finna symtomen. Kontrakt läkaren omedelbart om du har en infektion och symptom (såsom feber och smärtor) kvarstår eller förvärvas (se avsnitt 2). Läkaren ser även till att du har fått tillräckligt med vätska för att minska risken för biverkningar på njurerna.

Du bör endast ges detta läkemedlet om behandling med tabletter inte är möjlig. Du måste byta till behandling med tabletter så snart som detta är möjligt.

Detta läkemedel kommer att ges till dig under så kort tid som möjligt. Behandlingsstiden ska inte översteka 3 dagar.

Administreringsstätt

För intravens användning. Lösningen ska ges som en intravens infusion under 30 minuter.

Inspektera lösningen före användning. Lösningen ska kasseras om partiklar syns.

Om du ges först näringen av ibuprofen B. Braun

Eftersom ibuprofen har tillverkats av en läkare eller sjuksköterska är det osannolikt att du får få stör mängd av lösningen. Om du fått i dig stor mängd läkemedlet och om Lev. et barn har i sig läkemedlet vid misstag kontakta läkare, sjuksköterska eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 0800 147 111 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen kan inkludera tillstånd med blod, huvudvärk, ringningar i hören, förvirring, bristande rörelsekontroll (ataxial) och ryckiga ofriviliga snyggrörelser. Vid höga doser har däsighet, bröstmärta, hjärklappning, krampanfall (främst hos barn), svaghets- och vrysl, blödning i urin, frusenhets- och andningssvårigheter rapporterats.

Du kan också drabbas av lågt blodtryck, bläckigt misfärgning av hud eller slimmhinnor (cyanosis), blödning i mage eller tarm problem med lever- eller njurfunktion.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar kan minimeras genom att använda den lägsta effektiva dosen under kortast möjlig tid som behövs för att behandla symtomen. Du får en eller flera av de kända biverkningarna om NSAID-preparat (se nedan). Om du upplever något annat än dessa biverkningar ska behandlingen med detta läkemedel avbrytas och du ska kontakta läkare så fort som möjligt.

De vanligaste observerade biverkningarna påverkar mage och tarm. Peptiskt sår (sår i mag- eller tarm), häll- eller mag- eller tarmvärv (peritonit) eller blödning från mage eller tarm, ibland livetshotande, kan förekomma. Matsmältningsbesvär, tjärrkande avföring, blödning, kräkningar, inflammation i munhållens slimbinnar med särhördning i ulceros (stomatit), förvärdat inflammation i tjeck-tarmen (kolit) och Crohns sjukdom har rapporterats. Magkatarr (gästrit) har observerats i mindre vanliga fall. I synnerhet är risken för blödning i mage och tarm beröende av dosinntervall och behandlingsstid.

Vätskeansamling i värnvid (ödem), högt blodtryck och hjärtsvikt har rapporterats i samband med NSAID-behandling. Läkemedlet som ibuprofen kan ha ett samband med en liten ökad risk för hjärtattack (hjärtinfarkt) eller stroke.

Mycket sällsynt fall av allvarliga allergiska reaktioner (inklusive reaktioner vid infusionsstället, anafylaktisk chock) och allvarliga biverkningar på huden, alopezi (håravfall), huden blir jättes- och allergisk vaskult (inflammation i blodåder) har rapporterats.

Utanför samband med behandling med ibuprofen har rapporterats att ibuprofen kan ha en negativ tillverkning (DRESS-syndrom).

Röda, fallande utsträckda rövänder med krämer under huden och blödor till samsam med feber. Symtomen uppträder vanligtvis i början av behandlingen (akut generaliserad exantematis pustulos).

Mycket sällsynt fall av förväntad inflammation i samband med infektioner (t.ex. utveckling av en sjukdom som förstör vävnad som kallas nekrotiseringa fascit) som sammantfaller med användning av NSAID-preparat har rapporterats.

I enstaka fall kan allvarliga hudeninfektioner och mykävadnskomplikationer förekomma under en vattkoppinfektion.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

• Förtöjt och sömnloshet, huvudvärk och vrysl.

• Huvudvärk, buksmärtor, ilämändelse, kräkningar, väderspänning, diarré, förtöppning och smärre blödningar i mage och tarm som i enstaka fall kan orsaka blödning.

• De vanligaste observerade biverkningarna påverkar mage och tarm, ibland livetshotande, kan förvärva tillstånd med särhördning (peritonit) eller stroke.

• Mycket sällsynt fall av allvarliga allergiska reaktioner (inklusive reaktioner vid infusionsstället, anafylaktisk chock) och allvarliga biverkningar på huden, alopezi (håravfall), huden blir jättes- och allergisk vaskult (inflammation i blodåder) har rapporterats.

• Utanför samband med behandling med ibuprofen har rapporterats att ibuprofen kan ha en negativ tillverkning (DRESS-syndrom).

• Röda, fallande utsträckda rövänder med krämer under huden och blödor till samsam med feber. Symtomen uppträder vanligtvis i början av behandlingen (akut generaliserad exantematis pustulos).

Mycket sällsynt fall av förväntad inflammation i samband med infektioner (t.ex. utveckling av en sjukdom som förstör vävnad som kallas nekrotiseringa fascit) som sammantfaller med användning av NSAID-preparat har rapporterats.

I enstaka fall kan allvarliga hudeninfektioner och mykävadnskomplikationer förekomma under en vattkoppinfektion.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

• Sömnslöshet, upphetsning, irritabilitet eller trötthet, ångest och raslöshet.

• Synstörning.

NO – Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ibuprofen B. Braun 200 mg infusionsväskes, oppløsning

ibuprofen

Les nøyne gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

- Spar lege eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.

- Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever biverkninger. Dette gjelder også biverkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

Dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva ibuprofen B. Braun er och hva det brukes mot

Ibuprofen tillhör en grupper legemidler som kallas «ike-steroida antiinflammatoriske legemidler» eller NSAIDs.

Dess legemidlet brukes til ungdömer och barn som vejer 20 kg eller mer och som är 6 år eller äldre, för kortvarig behandling av akuta, moderate smärtor och feber. Det vil bli gitt med blodinför (intravenös) närtid om du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.

du har en tillstånd som gör att du letar bort eller har pågående blödningar.