

FI – Pakkaukseloste: Tietoa käyttäjälle

0665/12632533/0724

Ibuprofen B. Braun 600 mg infuusioneste, liuos

ibuprofeeni

Lue tämä pakkaukseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tästä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeät tietoja.

- Säilytä tämä pakkaukseloste. Voi tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kystytävä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

- Jos havaitset haittaavaliukutusia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittaavaliukutusia, joita ei ole mainittu tässä pakkaukselostessa.

Ks. kohta 4.

Tässä pakkaukselostessa kerrotaan

1. Mitä Ibuprofen B. Braun ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tietettävä, ennen kuin sinulle annetaan Ibuprofen B. Braun -valmistetta
3. Miten Ibuprofen B. Braun -valmistetaan
4. Mahdolliset haittaavaliukutukset
5. Ibuprofen B. Braun -valmiste säälyttämisen
6. Pakkauskuosi sisältää ja muuta tietoa

1. Mitä Ibuprofen B. Braun ja mihin sitä käytetään

Ibuprofeeni kuuluu tulehduskulpiäkkideen lääkeyrhmään.

Tästä lääkkeestä käytetään aikuisin akutin kivun lyhytkosteeseen oireennuksiaiseen hoitoon silloin, kun lääkeestä antamisen laskimoon on kliinisesti perusteltu erivärtä muttu antautua ole mahdollista.

Ibuprofeenista, jota Ibuprofen B. Braun sisältää, voidaan jousku käyttää myös muiden kuin tässä pakkaukselostessa määritettyjen sairauskojen hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkerikinoloonneita tai muulta terveydenhuollon ammattilaistesta tarvittaessa ja noudata aina helsinkiläistä saamia ohjeita.

2. Mitä sinun on tietettävä, ennen kuin sinulle annetaan Ibuprofen B. Braun -valmisteita

Ibuprofen B. Braun -valmisteita ei saa antaa:

- jos olet allerginen ibuprofeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (luetteloiduissa 6)
- jos sinulla on jousku ollut hengenhalistusta, astmaa, ihottumaan, ruuhaa tai naurua kutusina tai kasvojen turpoamisista, kun olet aikaisemmin ottanut ibuprofeenin, asetylisaalisylihappoa tai muita samankaltaisia lääkeaineita (tulehduskulpiäkkiteet).
- jos sinulla on jousku ollut muutamaa tunnua, kun olet eteenpäin verenuvoutu, (kaksi tai useampia) episodissa
- jos sinulla on ilmenyt mahalaatu tai suuliston vertausreaktiot tai puukirja, kun olet uuttaen tulehduskulpiäkkiteitä
- jos sinulla on aiouverenuvoutu (aiouverenuonten vuoto) tai muu aktiivinen verenuvoutu
- jos sinulla on kuoressa vauria munuaisia, maksi- tai sydänsairais
- jos elintiöstö on vaikuttanut kuoressa, ripulinsä tai riittämättömän nesteen saannin vuoksi
- jos olet raskaana raskauden viimeisellä kolmanneksella.

Varioitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät tästä lääketä.

Ibuprofeenin kaltainen tulehduskulpiäkkideen käyttöön voi liittyä pieni sydänkohtauksen tai aivo-hallavaukseen riskin suureneminen, erityisesti kun mitä käytetään seuraavissa annoksissa. Suositeltava annosta tai hoidon kestoa ei pidä yliittää.

Ihoreaktion

Vainka ihoreaktion, mukaan lukien eksfoliatiivinen dermatiitti, erythema multiforme, Stevens-Johnson-oireyhtymä, toksinen epidermalinen nekrosys, ateriohertteryyterveys (DRESS-oireyhtymä) ja ateriohertteryyterveys (eksozitomatoopatia) (AGEP), on raportoitu ibuprofeenin hoitoon yhteydessä. Lopeta ibuprofen B. Braun -valmisteita välittömästi ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Merkkejä alergiasta reaktiosta tähän lääkkeeseen, mukaan lukien hengitysvaikeusia, kasvojen ja kaulan alueen turvapainoja (angioedema), kuten sydänkohtauksen, rasisuuden ja rauoslaatutus.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai sairaanhoitajan lääkärin, jos ihoreaktion on seuraavaa.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Jos ihoreaktion tapahtuu, lopeta ibuprofeenin hoito ja ota yhteys lääkärin tai apteekkerikinoloon.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver starkt uppmärksamhet. En av faktorer som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av dess effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av denna effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bopackesdet för rägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ibuprofen B. Braun innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 360 mg natrium (huvudningsdrienen i koksalt/bordssalt) per flaska. Detta motsvarar 18,0 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

3. Hur du får ibuprofen B. Braun

Detta läkemedel omedelbart avläkrares tillämpning är att få en läkare och ges till dig av en läkare eller sjukskötarska i en miljö där lämplig utrustning finns tillgänglig.

Rekommenderad dos för vuxna är 600 mg intravens infusions (som drop i ven). En till 600 mg kan ges efter 6-8 timmar beroende på tillståndet svårhetsgrad och svar på behandlingen. Den högsta dagliga dos är 2 100 mg över 24 timmar.

Den längsta effektiva dosen ska användas under kortast möjliga tid för att lindra symptomten. Kontakta läkaren omedelbart om du har en infektion och symptomten (såsom feber och smärta) kvarstår eller förvärvas (se avsnitt 2). Läkaren ser även till att du har fått tillräckligt med vätska för att minska risken för biverkningar på njurerna.

Användning ska begränsas till situationer när behandling med tabletter är olämplig. Patienter måste byta till behandling med tabletter så snart som detta är möjligt.

Detta läkemedlet är endast avsett för akut kontrollsbehandling och ska inte användas i mer än 3 dagar.

Administreringsstätt

För intravens användning. Lösningen ska ges som en intravens infusion under 30 minuter. Läkemedlet är avsett för engångsbruk. Inspektera lösningen före användning. Lösningen ska kasseras om partiklar syns eller om den är missfärgad.

Om du ges för stor mängd av ibuprofen B. Braun

Om du fått i dig för stor mängd läkemedlet eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misttag kontakta läkare, sjukhus eller läkarmaterialcenter (tel. 112 Sverige, 0800 147 111 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tror att du har fått för stor mängd ibuprofen ska du omedelbart rådfråga läkare eller sjukskötarska.

Symtomen kan innefatta ihärdning, magont, kräkningar (med blod), huvudvärk, ringningar i öronen, förvirring och ryckiga ofrivilliga ågonrörelser. Vid höga doser har diabetisk, bröstmärta, hjärtkrampling, medvetessvält, krampanfall, diaré, förtöningar, försvikt, blödning, kräkningar, utslagning, blodig urin, blödning i urinen och andningsvärtighet rapporterats. Du kan också drabbas av lågt blodtryck, bläckigt misfärgning av hud eller slimmhinnor (cyanos), blödning i mage eller tarm samt problem med lever- eller njurfunktion.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjukskötarska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användande behöver inte få dem.

Biverkningar kan minimeras genom att använda den längsta effektiva dosen under kortast möjliga tid som behövs för att behandla symptomten. Du kan få en flexibel avläkning i samband med detta läkemedlet avnytters och du ska kontakta läkaren så fort som möjligt. Äldre patienter som får behandling med detta läkemedlet löper högre risk för att utveckla problem i samband med biverkningar.

De vanligast observerade biverkningarna är biverkningar i mag-tarmkanalen (påverkar mage och tarm). Peptiska sår (i mage eller tarm), perforation (hål i mage- eller tarmväggen) eller blödningar från mage eller tarm, ibland blödning från hårda, kan förekomma. Ihärdning, kräkningar, diaré, väderspänning, förtöningar, matstötningar, buksmärta, tårjkramplingar, förvärvar, kolit (inflammation i tjocktarmen) och Crohns sjukdom har rapporterats. Gastri (mag-läkar) har observerats i mindre vanliga fall. I synnerhet är risken för blödning i mage och tarm beredande av dosinbalansen och behandlingsstidet.

Övriga (i särskilda fall) biverkningar är huvudvärk och hjärtvärk. Ibuprofen har rapporterats i samband med NSAID-syndrom. Läkemedlet ibuprofen kan ha ett samband med en liten ökad risk för hjärtattack (hjärtinfarkt) och stroke.

Mycket sällsynt fall av allvarliga allergiska reaktioner (inklusive reaktioner vid infusionsstället, anafylaktisk chock) och allvarliga biverkningar på huden, ålopecia (håravfall), huden blir justhårig och allergisk vaskultus (inflammation i blödärt) har rapporterats.

Slutligen rapporteras att ibuprofen kan orsaka biverkningar i mag-tarmkanalen (påverkar mage och tarm), förstörhet, ikke upphetsning, mätavelvakt och ålopecia (håravfall).

Röda, fäjallande utbreda utslag med knölar under huden och blåsor tillsammans med feber.

Symtomen uppträder vanligtvis i början av behandlingen (akut generalisert exantematis pustulosus).

Mycket sällsynt fall för avvärtrad inflammation i samband med behandlingsstidet.

Detta kan orsaka hufinfektioner och mykuvävnadskomplikationer förekomma i samband med en nekrotisering fascit som sammanfaller med användning av NSAID-preparat.

I enstaka fall kan allvarliga hufinfektioner och mykuvävnadskomplikationer förekomma i samband med en utvärkspunktinfektion.

Mycket sällsynt biverkningar (kan förekomma hos fler än 10 personer):

• Trötthet eller sömnslitet, huvudvärk och åsvel.

• Halsbråna, buksmärta, ihärdning, kräkningar, väderspänning, diaré, förtöningar och smärtor.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

• Värme.

• Hudreaktion.

• Smärtor och brännande känsla vid administreringsstället.

• Sår i mag-tarmkanalen, möjligen med blödning och perforation. Muninflammation med sår (ulceros stomatit), förvärvar tjecktarm-inflammation (kolit) och Crohns sjukdom.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

• Sömnslöshet, upphetning, irriterbarhet eller trötthet, ångest och raslöshet.

• Systonjärn.

• Tinitus (örönringningar).

• Inflammation i mag-slemhinnan.

• Minskad urinproduktion och väteansamling i vävnad (ödem), särskilt hos patienter med högt blodtryck eller njurproblem, nefrotiskt syndrom, interstitiell njurinflammation som kan följas av akut njursvikt.

NO – Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ibuprofen B. Braun 600 mg infusionsvätske, opplösning

ibuprofen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

- Spar lege eller sykepleier hұrs du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.

- Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever biverkninger. Dette gjelder også biverkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva ibuprofen B. Braun er og hva det brukes mot

Ibuprofen tilhører en grupper legemidler som kalles «ikke-steroider antiinflammatoriske legemidler» eller NSAIDs.

Dette legemidlet brukes til voksent for kortvarig behandling av akutte, moderate smerten. Det blir gitt nära intravens bruk er egnet, og när andre måter å gi legemidlet på ikke är mulig.

I enstaka fall kan allvarliga hufinfektioner och mykuvävnadskomplikationer förekomma i samband med en utvärkspunktinfektion.

Mycket sällsynt biverkningar (kan förekomma hos fler än 10 personer):

• Trötthet eller sömnslitet, huvudvärk och åsvel.

• Halsbråna, buksmärta, ihärdning, kräkningar, väderspänning, diaré, förtöningar och smärtor.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

• Sömnslöshet, upphetning, irriterbarhet eller trötthet, ångest och raslöshet.

• Systonjärn.

• Tinitus (örönringningar).

• Inflammation i mag-slemhinnan.

• Minskad urinproduktion och väteansamling i vävnad (ödem), särskilt hos patienter med högt blodtryck eller njurproblem, nefrotiskt syndrom, interstitiell njurinflammation som kan följas av akut njursvikt.

Detta legemidlet kan alltid förlänga tid för hjärtinfarkt och stroke.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.

Hvis du har hjärt- och kärlproblemer, har ibuprofen B. Braun en negativ effekt på hjärtat.